


症狀

十秒讀懂茲卡病毒

(Zika virus)




發燒



頭痛



關節疼痛



斑丘疹




怎麼預防？

潛伏期

3 12

3~12天



使用紗窗紗門
隔絕蚊蟲




穿著淺色長袖長褲



清除孳生源




避免被蚊蟲叮咬



結膜炎

返國注意事項：有任何不適撥打免付費 **1922**

孕婦或計畫懷孕婦女請注意!!!



孕婦感染可能導致胎兒小頭畸形或死亡，建議暫緩前往流行地區。從流行地區返國後，並定期胎兒超音波追蹤及告知醫師旅遊史。

最新茲卡病毒疫情資訊可至疾管署網站查詢



茲卡注意!!

一起保護身邊你我她



孕婦感染可能導致
胎兒小頭畸形或死亡

對象・預防方法



孕婦



計畫
懷孕
婦女

暫緩前往 流行地區



孕婦



計畫
懷孕
婦女



一般
民眾

若需前往流行地區

- * 可先至國內**旅遊醫學門診**評估感染風險，並作好出國準備。
- * 穿**淺色長袖衣褲**、塗抹衛福部核可的**防蚊藥劑**等防蚊措施。

感染症狀



發燒



頭痛



關節疼痛



斑丘疹



結膜炎

流行地區



警示
中南美洲
加勒比海地區



注意
東南亞
印尼、馬來西亞
泰國、馬爾地夫

最新疫情請上疾管署網站查詢

有相關疑問撥打
1922

